

Fertilizante Biológico
Fungicida - Terápico para tratamiento de semillas

Rizopack **i2pOc1 HC**

INSTRUCCIONES DE USO


Procedimiento para inocular 3.000 kg de semillas de soja con **Rizopack i2pOc1 HC** hasta 7 días antes de la siembra.



1. Colocar el contenido de 3 vejigas de 2 L c/u de **RIZOLIQ TOP II** (total 6 L) en un recipiente limpio.



2. Agregar el contenido de 3 bidones de 3 L c/u de **RITIRAM CARB** (total 9 L) y revolver durante algunos segundos hasta obtener una mezcla uniforme.



3. Proceder a inocular las semillas en forma inmediata. Aplicar la totalidad de esta mezcla (15 L) a 3.000 kg de semilla, o su equivalente de 250 mL cada 50 kg.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Todo el procedimiento debe realizarse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.
- Una vez preparada la mezcla que contiene **RITIRAM CARB**, se recomienda realizar la inoculación antes de transcurridas las 2 horas de su preparación.
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda orear la semilla tratada (al menos 30 minutos) hasta que ésta se encuentre completamente seca, antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

 **RIZOBACTER**

Avda. Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 - Calle Nº 1 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs.As.) - Argentina
Tel.: 54-2477-409400.
www.rizobacter.com